

Tabelle: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten					Alter in Jahren							
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	9-14	15-17	ab 18	ab 60		
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2	A (ggf. N) ^e				
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2	A (ggf. N) ^e				
Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2	A (ggf. N) ^e				
Hib H. influenzae Typ b		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N							
Poliomyelitis		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N		A1	ggf. N				
Hepatitis B		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N							
Pneumokokken 3		G1		G3	G4	N						S ^g		
Rotaviren	G1 ^b	G2	(G3)											
Meningokokken C						G1 (ab 12 Monaten)		N						
Masern						G1	G2	N			S ^f			
Mumps, Röteln						G1	G2	N						
Varizellen						G1	G2	N						
Influenza											S (jährlich)			
HPV Humane Papillomviren											G1 ^d	G2 ^d	N ^d	

Erläuterungen

- G** Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4)
- A** Auffrischimpfung
- S** Standardimpfung
- N** Nachholimpfung (Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

- a** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.
- b** Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c** Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- d** Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9 – 14 Jahren mit 2 Dosen im Abstand von 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).
- e** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- f** Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
- g** Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.

Quelle: Robert Koch-Institut / Epidemiologisches Bulletin Nr. 34, 24. August 2017